



ICCS

Istituto Clinico Città Studi

PRÉPARATION TAC AVEC ET SANS PRODUIT DE CONTRASTE INTRAVEINEUX DE TOUTE PARTIE DU CORPS

PRÉPARATION À L'EXAMEN:

1. Se présenter à **jeun depuis au moins six heures.**
2. Au moment de l'examen, apporter la documentation suivante (*nécessaire pour l'utilisation de composés iodés*) :

- **Créatinémie**

Les examens indiqués ci-dessus sont **valables trois mois.**

Le jour de l'examen, prendre le traitement à domicile habituel en suivant les indications du médecin généraliste, à l'exception de :

- Metformina qui doit être suspendue dans les deux jours précédant l'examen et dans les deux jours suivant l'examen.

Remarques

En cas d'allergies au produit de contraste ou de graves allergies aux médicaments ou substances, consulter le médecin généraliste et présenter le protocole de prémédication ci-joint.

Lors de l'examen, le Patient doit apporter toute la documentation médicale pertinente au problème clinique en cours d'évaluation.



NOTE D'INFORMAZIONE - TOMOGRAFIE COMPUTÉRISÉE

Qu'est-ce que la Tomographie Computérisée (TC) ?

La Tomographie Computérisée est une technique de diagnostic radiologique qui permet d'étudier les différentes parties du corps grâce à l'acquisition d'images en section : comme si l'organe examiné était coupé en « tranches » et chaque tranche était photographiée. Ensuite, il est possible de produire d'autres images reconstruites dans les différents plans et à l'aide de programmes consacrés à l'étude de problématiques particulières (par ex. l'étude des vaisseaux sanguins).

Combien de temps dure l'examen ?

Les dispositifs multicouches modernes (qui acquièrent simultanément plusieurs « tranches ») permettent d'effectuer des examens dans de très brefs délais : la durée moyenne est d'environ 20 minutes.

Comment se déroule l'examen ?

Le patient est allongé sur un lit qui se déplace dans la direction longitudinale à l'intérieur d'une structure annulaire circulaire. La partie du corps à examiner est soumise à un faisceau de rayons X, puis l'appareil reconstitue les images électroniques produites et les envoie à un écran pour la visualisation. Les images sont ensuite fournies sur disque.

Quand la TC est-elle demandée ?

La TC peut explorer toutes les parties du corps (encéphale, thorax, abdomen, os, vaisseaux, etc.).

Pour les examens de base, sans injection de produit de contraste, la seule contre-indication à l'examen est l'état de grossesse.

L'examen TC n'est pas douloureux et il est peu invasif. Cependant, il ne s'agit pas d'un examen de diagnostic de premier niveau et il doit donc être prescrit par le médecin dans certains cas et pour des problèmes de diagnostic spécifiques.

Quand le produit de contraste est-il utilisé ?

Pour certains types d'examen, l'injection intraveineuse d'un produit de contraste particulier à base d'iode est nécessaire car elle permet de mettre en évidence les différences entre les différentes structures et tissus. Dans ce cas, le patient doit se présenter à jeun le matin de l'examen.

Les contre-indications à son utilisation sont des allergies spécifiques connues (qui doivent être signalées auparavant au service de radiologie) ou la présence d'une insuffisance grave de la fonction des reins ou du foie. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'effectuer au préalable une simple prise de sang avec le dosage de la créatinine et le résultat doit être présenté au médecin au moment de réaliser l'examen. Le patient doit aussi remplir, de préférence avec son médecin, la fiche de Consentement éclairé donnée au moment de la réservation et l'apporter lors de la réalisation de l'examen. Comme pour tous les médicaments, le produit de contraste TC peut lui-aussi, bien que rarement, provoquer des réactions allergiques même graves qui peuvent être traitées efficacement.

**ICCS**

Istituto Clinico Città Studi

DÉCLARATION DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET PARTAGÉ AUX PROCÉDURES DE DIAGNOSTIC AVEC UN PRODUIT DE CONTRASTE ORGANO-IODÉ

Monsieur/Madame _____

Examen requis : _____

Objet du diagnostic : _____

L'examen est indiqué et irremplaçable aux fins du diagnostic et d'une détermination correcte de la thérapie.

Conformément à la Note du Ministère de la Santé datant du 17/09/1997 sur l'utilisation des produits de contraste (PDC), le patient doit impérativement être informé sur les éléments anamnestiques ou cliniques relatifs à :

Anamnèse allergique ou risque allergique avéré aux produits de contraste iodés (dans ce cas, il faut effectuer une désensibilisation)	OUI	NON
Grossesse en cours	OUI	NON
Formes de grave insuffisance cardio-vasculaire	OUI	NON
Paraprotéinémie ou myélome multiple	OUI	NON
Facteurs prédisposant à l'insuffisance rénale (diabète, goutte, cirrhose du foie, utilisation de médicaments néphrotoxiques, intervention précédente de chirurgie rénale)	OUI	NON
Examen récent (< 5 jours) avec produit de contraste intraveineux	OUI	NON
Insuffisance rénale sévère	OUI	NON
Diabète		
Si le patient prend un traitement avec des biguanides (Metformina), il doit le suspendre 2 jours avant et 2 jours après l'examen.	OUI	NON
Créatinine (_____ mg/dl) (indiquer la valeur de l'examen effectué dans les 3 mois précédant la date de la réservation de l'examen avec PDC)		

TAMPON ET SIGNATURE DU MÉDECIN DEMANDANT L'EXAMEN

Je soussigné(e) _____ déclare avoir bien compris ce qui est illustré dans la fiche d'information. En particulier, lors de l'entretien avec le médecin prescripteur, j'ai pu comprendre, dans leur contenu essentiel, les caractéristiques de la procédure en termes de modalités d'exécution, de modalités de préparation, de finalités et d'avantages, de risques associés et de complications (cet examen, et cela vaut pour toutes les disciplines médicales, n'est pas exempt de complications, même s'il est réalisé avec soin, diligence et prudence ; ces complications peuvent très rarement et de manière imprévisible être mortelles - environ 1 cas sur 200 000 injections).

Ayant pris acte de la situation illustrée et étant conscient(e) que le consentement peut être révoqué à tout moment

 je consens **je ne consens pas**

à me soumettre à la procédure indiquée.

Milan, le _____ Signature du Patient ou du tuteur légal _____

Ayant pris acte et vérifié directement avec le patient ce qui est indiqué et signé par le médecin traitant :Milan, le _____ **TAMPON ET SIGNATURE DU RADIOLOGUE** _____



ICCS

Istituto Clinico Città Studi

SCHÉMA DE PRÉ-TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE CHEZ LES PATIENTS PRÉSENTANT UNE ALLERGIE AU PRODUIT DE CONTRASTE (organo-iodé et paramagnétique)

24 HEURES AVANT L'EXAMEN, PRENDRE:

- ▶ DELTACORTENE - 1 comprimé de 25 mg
- ▶ CETIRIZINA - 1 comprimé de 10 mg
- ▶ ZANTAC - 1 comprimé de 150 mg

13 HEURES AVANT L'EXAMEN, PRENDRE:

- ▶ DELTACORTENE - 1 comprimé de 25 mg
- ▶ CETIRIZINA - 1 comprimé de 10 mg
- ▶ ZANTAC - 1 comprimé de 150 mg

7 HEURES AVANT L'EXAMEN, PRENDRE:

- ▶ DELTACORTENE - 1 comprimé de 25 mg
- ▶ CETIRIZINA - 1 comprimé de 10 mg
- ▶ ZANTAC - 1 comprimé de 150 mg

1 HEURE AVANT L'EXAMEN, PRENDRE :

- ▶ CETIRIZINA - 1 comprimé de 10 mg

