

PRÉPARATION POUR L'UROGRAPHIE INTRAVEINEUSE

PRÉPARATION À L'EXAMEN :

Pendant les trois jours précédant l'examen, il faut adopter une alimentation pauvre en *produits laitiers* (*pain, pâtes, riz, légumes et légumes secs*).

LE JOUR DE L'EXAMEN :

1. Se présenter à **jeun depuis au moins six heures**.
2. Au moment de l'examen, apporter la documentation suivante (*nécessaire pour l'utilisation de composés iodés*) :

- Créatinémie

Les examens indiqués ci-dessus sont **valables trois mois**.

3. Le jour de l'examen, prendre le traitement à domicile habituel en suivant les indications du médecin généraliste, à l'exception de :

- Metformina qui doit être suspendue dans les deux jours précédant l'examen et dans les deux jours suivant l'examen.

Remarques

En cas d'allergies au produit de contraste ou de graves allergies aux médicaments ou substances, consulter le médecin traitant et présenter le protocole de prémédication ci-joint.

Lors de l'examen, le Patient doit apporter toute la documentation médicale pertinente au problème clinique en cours d'évaluation.

SCHÉMA DE PRÉ-TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE CHEZ LES PATIENTS PRÉSENTANT UNE ALLERGIE AU PRODUIT DE CONTRASTE (organo-iodé et paramagnétique)

24 HEURES AVANT L'EXAMEN, PRENDRE:

- DELTACORTENE - 1 comprimé de 25 mg
- CETIRIZINA - 1 comprimé de 10 mg
- ZANTAC - 1 comprimé de 150 mg

13 HEURES AVANT L'EXAMEN, PRENDRE:

- DELTACORTENE - 1 comprimé de 25 mg
- CETIRIZINA - 1 comprimé de 10 mg
- ZANTAC - 1 comprimé de 150 mg

7 HEURES AVANT L'EXAMEN, PRENDRE:

- DELTACORTENE - 1 comprimé de 25 mg
- CETIRIZINA - 1 comprimé de 10 mg
- ZANTAC - 1 comprimé de 150 mg

1 HEURE AVANT L'EXAMEN, PRENDRE:

- CETIRIZINA - 1 comprimé de 10 mg