

PREPARAZIONE RMN MULTIPARAMETRICA PROSTATA

PREPARAZIONE ALL' ESAME:

1. Presentarsi a **digiuno da almeno sei ore**
2. Due ore prima dell'esame praticare un clistere di pulizia tipo clisma fleet (da acquistare in farmacia)
3. Esibire al momento dell'esame il seguente esame
 - **Creatinina**

Il sopra indicato esame ha una **validità di tre mesi**.

Il giorno dell'esame assumere l'abituale terapia domiciliare secondo l'indicazione del proprio medico di base.

Note

- **Il Paziente deve portare con sé al momento dell'esame, tutta la documentazione relativa alla patologia prostatica (ecografia trans-rettale, valori di PSA, esiti di biopsie, visite urologiche).**
- In caso di allergie al mezzo di contrasto o gravi allergie a farmaci o sostanze, rivolgersi al proprio medico curante e presentare il protocollo di pre-medicazione allegato.
- In caso di insufficienza renale cronica di stadio elevato (*creatinina > 1,2mg/dL e GFR <30 ml/min/1.73 m²*) l'uso di mdc è valutato con cautela da Medico Radiologo. Dovrebbero trascorrere almeno 7 giorni tra due iniezioni (considerando anche iniezioni di mdc iodato in TC). Se in dialisi, si raccomanda ulteriore seduta di emodialisi appena possibile.

Si invita all'atto della prenotazione, di comunicare telefonicamente, al personale del sito RM, se il paziente è BARELLATO e l'orario stimato di arrivo in struttura. (tel. 02 2393 4215-2999)

Sig./a _____ nato/a il _____

Peso kg _____ Inviato da _____

Soffre di claustrofobia? Si No
 Ha mai lavorato come saldatore, tornitore, carrozziere ecc.? Si No
 Ha mai subito incidenti stradali o di caccia? Si No
 E' stato vittima di esplosioni? Si No
 E' in stato di gravidanza? (Data ultime mestruazioni _____) Si No

Ha subito interventi chirurgici su:

Testa	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Addome	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Collo	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Estremità	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Torace	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Altro	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

E' portatore di:

Schegge o frammenti metallici? Si No
 Clips metalliche su aneurismi (vasi sanguigni), aorta, cervello? Si No
 Protesi valvolari cardiache? Si No
 Filtri, stent, spirali metalliche endovascolari? Si No
 Distrattori della colonna vertebrale? Si No
 Pompa infusione per insulina o altri farmaci? Si No
 Pace-maker cardiaco o altri cateteri cardiaci? Si No
 Corpi metallici nelle orecchie o protesi uditive impiantate? Si No
 Neurostimolatori, elettrodi impiantati nel cervello o subdurali? Si No
 Dispositivi intrauterini (IUD)? Si No
 Derivazione spinale o ventricolare? Si No
 Protesi metalliche (per fratture, interventi articolari), viti, chiodi, filo
 Localizzazione _____ Si No
 Protesi dentarie fisse o mobili? Si No
 Protesi del cristallino? Si No
 E' affetto da anemia falciforme? Si No

Data _____

Il radiologo che autorizza l'esame _____

Per effettuare l'esame occorre:

togliere eventuali lenti a contatto, occhiali, apparecchi per l'udito, protesi dentarie mobili, cinta sanitaria, fermagli per capelli, mollette, gioielli, orologi, fermagli, monete, chiavi, ganci automatici e qualunque tipo di oggetti metallici, carte di credito e schede magnetiche. Asportare cosmetici dal volto.

Si informa che l'esposizione a campi magnetici e a onde di radiofrequenza può provocare la perdita di efficacia anticoncezionale del dispositivo intrauterino (IUD): se Lei ne è portatrice, la Sua firma vale come accettazione a sottoporsi ugualmente all'esame in questione.

Si prega di segnalare la presenza di:

è portatore di cerotti medicali?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
è portatore di tatuaggi o piercing	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
protesi dentarie magnetiche?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Con la presente si dichiara di essere stato sufficientemente informato:

- *sulla tecnica utilizzata*
- *sull'importanza delle risposte fornite.*

Firma del paziente _____

NOTA INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO

PER INDAGINE DI RISONANZA MAGNETICA CON MEZZO DI CONTRASTO PER VIA PARENTERALE

Cos'è la Risonanza Magnetica (RM)?

La Risonanza Magnetica è una tecnica diagnostica che consente di ottenere immagini in sezione del corpo umano utilizzando l'interazione tra un campo magnetico ad alta potenza ed impulsi di onde radio. La principale componente dell'apparecchiatura è rappresentata dal magnete al centro del quale, disteso su un apposito lettino, è posizionato il paziente.

Le principali indicazioni sono rappresentate da malattie del sistema nervoso e del sistema scheletrico-articolare.

Quali sono i vantaggi?

Il principale vantaggio consiste nel fatto di esaminare il corpo senza utilizzare radiazioni ionizzanti (raggi X); altri vantaggi indiscussi sono la possibilità di indagare ampi distretti corporei e contemporaneamente la scarsa invasività.

Quanto dura l'esame?

La durata dell'esame è normalmente compresa tra 30 e 45 minuti.

Cosa bisogna fare prima dell'esame?

L'esposizione a campo magnetico e ad onde radio può essere controindicata in alcuni casi. È quindi indispensabile che il paziente compili, preferibilmente insieme al suo Medico Curante o allo Specialista il Questionario preliminare consegnato all'atto della prenotazione e la consegni al Personale preposto al momento dell'esame.

Se si rilevano controindicazioni personali assolute o relative è necessario contattare il Servizio di Radiologia prima della data dell'esame per evitare di presentarsi all'appuntamento e non poter eseguire l'esame.

Quali sono le principali controindicazioni all'esame?

Controindicazioni assolute sono: portatore di Pace-Maker, portatore di clips vascolari metalliche (aortiche, cerebrali,...), portatore di neurostimolatori o pompe di infusione, gravidanza (specie primo semestre). Esistono poi altre controindicazioni relative elencate nel Questionario.

Come si svolge l'esame?

Prima di eseguire l'esame è necessario togliere lenti a contatto, protesi dentarie mobili, apparecchi acustici, occhiali, fermagli per capelli, orologi, cosmetici dal volto ed ogni tipo di oggetto metallico.

Durante l'esecuzione dell'esame è necessario che il paziente rimanga disteso immobile su un apposito lettino al centro del magnete. La collaborazione del paziente nel mantenere l'immobilità è fondamentale per una corretta riuscita dell'esame.

L'apparecchiatura ricostruisce successivamente le immagini elettroniche prodotte e le invia ad un monitor per la visualizzazione. Le immagini vengono successivamente fornite su dischetto.

Quando di usa il mezzo di contrasto?

Nel caso di particolari problemi diagnostici può essere iniettato endovena, tramite agocannula in precedenza posizionata al gomito, un particolare mezzo di contrasto specifico per RM a base di gadolinio in grado di aumentare la qualità del segnale proveniente dai tessuti corporei. Non esistono controindicazioni assolute al suo utilizzo eccetto note allergie specifiche (che devono essere segnalate precedentemente alla Radiologia) o la presenza di grave insufficienza della funzione dei reni o del fegato o altre particolari condizioni cliniche. È per questa ragione che è necessario eseguire precedentemente un semplice prelievo del sangue con dosaggio della creatinemia ed il risultato deve essere mostrato al Medico al momento dell'effettuazione dell'esame RM.

Come per tutti i farmaci anche il mezzo di contrasto RM può, sebbene molto raramente, scatenare reazioni allergiche anche gravi che potranno essere efficacemente trattate.

Il paziente deve in questo caso presentarsi a digiuno la mattina dell'esame.

CONSENSO INFORMATO

Il Signor/a _____ data nascita _____

Informato sui rischi concernenti l'impiego di mezzo di contrasto per via parenterale, avendo letto e compreso la nota informativa a riguardo,

acconsento

non acconsento

a sottopormi all'indagine di risonanza magnetica con mezzo di contrasto.

Milano, li _____

Firma del Paziente o Tutore legale

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO RADIOLOGO

SCHEMA DI PRE-TRATTAMENTO FARMACOLOGICO IN PAZIENTI CON ALLERGIA AL MEZZO DI CONTRASTO (organo-iodato e paramagnetico)

24 ORE PRIMA DELL'ESAME ASSUMERE:

- DELTACORTENE - 1 compressa da 25 mg
- CETIRIZINA - 1 compressa da 10 mg
- OMEPRAZOLO - 1 compressa da 20 mg

13 ORE PRIMA DELL'ESAME ASSUMERE:

- DELTACORTENE - 1 compressa da 25 mg
- CETIRIZINA - 1 compressa da 10 mg
- OMEPRAZOLO - 1 compressa da 20 mg

7 ORE PRIMA DELL'ESAME ASSUMERE:

- DELTACORTENE - 1 compressa da 25 mg
- CETIRIZINA - 1 compressa da 10 mg
- OMEPRAZOLO - 1 compressa da 20 mg

1 ORA PRIMA DELL'ESAME ASSUMERE:

- CETIRIZINA - 1 compressa da 10 mg